

## DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE ELAPHINIS

PAR A. BOURGOIN

---

**Elaphinis Patrizii** n. sp. — Supra opaca, cervina, nigro-variegata, albo-punctata; subtus nigra, nitida; clypeo attenuato, exciso, angulis anticis reflexis; pronoto antice tuberculato, lateribus postice fortiter rotundatis; processu mesosternali rubro, acuto, inter coxas non angustato.

Long. 9 mm.; lat. 5,5 mm.

Somalia italiana, Jack Sciumo (Giuba). Patrizii (1923).

Type: Mus. Civ. di Stor. Nat. Genova.

Tête jaune rougeâtre, à pubescence flave, grossièrement ponctuée, surtout sur le front; clypéus régulièrement mais modérément atténué vers l'avant, assez profondément échancré, ses angles antérieurs relevés, émoussés. Pronotum brun verdâtre, irrégulièrement mélangé de fauve, parsemé, sans ordre, de points blanchâtres et portant une tubérosité allongée, lisse, au milieu de son bord antérieur; sa plus grande largeur à sa base qui est très largement arrondie, presque rectiligne devant l'écusson; angles postérieurs très obtus, très arrondis, à peine indiqués; de là, rétréci en avant en ligne incurvée, sans angle latéral; pubescence flave en avant et sur les côtés. Epimères portant un point blanc au milieu de leur bord postérieur. Écusson fauve, à sommet arrondi, ayant une ligne brunâtre en son milieu. Élytres convexes, peu atténués en arrière, fauves à macules noires irrégulières, plus nombreuses et plus grandes vers la suture; quelques unes sur les bords; dix stries ou lignes de points un peu sinueuses sur chaque élytre, rapprochées par deux entre des côtes peu élevées; les internes nettement striolaires, les latérales formées de points séparés; suture caréniforme et terminée en pointe très courte à son sommet. Pygidium brillant, à pubescence et macules blanchâtres, noir ou varié de rougeâtre, convexe, ayant une fossette ronde, non squamulée, de chaque côté

de sa base; sa surface irrégulièrement et finement vermiculée, plus densément à son sommet.

Dessous noir, brillant, pubescent, lisse en son milieu, gravé latéralement de signes arqués; saillie mésosternale nullement resserrée entre les hanches, conique, à sommet rouge, un peu défléchi; ventre (♂) faiblement arqué; pattes brun rouge, très pubescentes; tibias antérieurs échancrés en arc entre la dent latérale et la terminale qui sont très aiguës; les médians et les postérieurs portant un cran dentiforme vers leur tiers apical externe; tarses graciles, plus longs que les tibias correspondants, leur premier article épineux.

Par sa forme générale et sa coloration, cette espèce ressemble à *E. simillima* Ancey, mais elle est plus petite, son clypéus, au lieu d'être carré et rectiligne en avant comme celui de *simillima*, est atténué et échancré; son pronotum est plus arrondi et rectiligne devant l'écusson; elle se rapproche en cela, de même que par la forme de son clypéus de *E. irrorata* Fabr.; mais elle s'en distingue par l'écusson qui n'a pas les côtés incurvés et le sommet aigu comme celui de *irrorata*; sa saillie sternale conique est bien plus courte que celle des *Dolichostethus*, genre dans lequel elle pourrait rentrer.

---